

Verdifull naturbeitemark

Artssammensetningen i naturbeitemark er preget av beiting, fordi dyr velger ut og beiter på de beste beiteplantene. Noen arter blir vraket på grunn av at de smaker dårlig, er giftige, stikkende eller seige. Beiting, særlig sauebeite, vil gi en mer gras- og mindre urtedominert plantebestand enn hva vi finner i slåttemark. Artene vil ha ujevn forekomst på beitearealet på grunn av ujevn fordeling av tråkk og husdyrgjødsel, og ujevn nedbeitingsgrad.



Naturbeitemark i Hysværet.

Bruk og skjøtsel

Langvarig bruk med beiting holder arealet åpent. Naturbeitemark driftes uten tilførsel av kunstgjødsel og/eller pløying og innsåing med produktive grasarter.

Artsmangfold

Naturbeitemark er ofte artsrik, spesielt på kalkrik grunn, og jevnlig nedbeiting gir gode livsbetingelser for lyselskende planter. Ved siden av mange gras- og halvgrasarter, er ryllik, føyblom, hvitkløver, engsoleie, engsyre, øyentrøst og bakkesøte typiske beitemarksarter.

Trua naturtype

Naturbeitemark er en truet naturtype på grunn av opphørt drift eller intensivering i landbruket. For å stimulere til beiting langt ut i øyan finnes det egne tilskuddsordninger både nasjonalt og spesielt for Vegaøyen verdensarv.

Naturbeitemark i Vegaøyen

I Vegaøyen er det kartlagt 6237 daa (6,2 km²) seminatural eng (slåttemark og naturbeitemark) hvorav 1611 daa er registrert som verdifull naturbeitemark.




Fig. 1: Seminatural eng/naturbeitemark i Vegaøyen