

# Lirype

*Lagopus lagopus*

## Kjennetegn

Lirype inngår i fasanfamilien. Den har brunspragla fjærdrakt. Hannen har en mørkere rødbrun farge på brystet og halsen. Halefjæra er svarte. Vingene, buken og føttene er kvite. Om vinteren har fuglen hvit drakt, men halefjæra og nebbet er fortsatt svart.



Foto: P. Thorvaldsen, NIBIO

## Biologi

Lirypa er monogam og begge partene tar del i oppfølging av kyllingene. Reiret er som regel skjult i kratt, og en fordypning i bakken. Høna legger 8–12 egg i mai/juni. Disse har ei rugetid på om lag 20–21 dager.

Lirypa spiser nesten utelukkende bjørkeskudd. Det er stilken til knoppen lirypa eter, selve knoppene blir kastet unna.

Rypene holder seg i kull om høsten, utover senhøsten/vinteren i større flokker. I snøvær, kuldeperioder og dårlig vær, graver de seg ned i snøen.

## Utbredelse i Norge

Lirypa har tilhold i fjellet og fjellbjørkeskogen, men finnes helt ned til sjøen i nordligere deler av Norge.

## Rødlistestatus

Lirype er vurdert som nært truet (NT) på grunnen av en betydelig bestandsnedgang.



Funn registrert i Artskart, Artsdatabanken